



# จดหมายข่าวส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม 2553

## เตือนโรคราแป้งระบาดในยางพารา

ด้วยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี สภาพอากาศของจังหวัดเลย ในตอนเช้ามีหมอกหนา ตอนกลางวันค่อนข้างร้อนหรือมีฝนตกปรอย ๆ ในบางวันตอนกลางคืนอากาศหนาวเย็น และความชื้นสูง ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมกับการเกิดโรคราแป้งระบาดบนใบยางอ่อนที่ผลิอกใหม่ ภายหลังจากการผลัดใบประจำปี ทำให้ใบยางหงิกงอ เน่าดำ และใบยางร่วงอีกครั้งหนึ่ง ดอกร่วง และกิ่งแขนงบางส่วนอาจแห้งตาย

**นางปทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลย** ได้ให้ข้อแนะนำในการป้องกันโรคราแป้งที่อาจจะระบาดในช่วงดังกล่าวนี้ว่า

1. เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงยางในช่วงที่ยางผลัดใบและกำลังผลิใบอ่อน หากตรวจพบอาการของโรคราแป้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2. ทำความสะอาดสวนยางโดยเก็บกวาดใบที่ร่วงเนื่องจากโรคราแป้ง นำออกไปเผาทำลายภายนอกแปลงยางให้หมดหรือทำปุ๋ยหมักเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อรา
3. หว่านปูนขาว หรือปูนมาร์ลหรือโคโลไมด์ให้ทั่วทั้งแปลงหรือฉีดพ่นด้วยกำมะถันผง ในอัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อไม่ให้เป็นพาหะระบาดในช่วงการแตกยอดอ่อนครั้งต่อไป
4. ยางเล็กที่สามารถฉีดพ่นสารเคมีทางใบได้ในขณะที่เริ่มแตกใบอ่อนให้ใช้สารเคมี เมโนมิล 50 % WP อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน ประมาณ 5-6 ครั้ง จนใบมีสีเขียวเข้ม
5. จุดไฟเผากำมะถันรมควันในสวนยาง โดยจุดเผาในทิศทางที่ลมสามารถพัดควันกำมะถันเข้าสวนยางได้ โดยทำหลายจุดต่อสวน เพื่อให้ควันกำมะถันกระจายไปทั่วทั้งสวน
6. ใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นยางแข็งแรงตามสูตรคำแนะนำในยางเล็ก และยางใหญ่ควรเพิ่มปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารเสริมหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ห้ามใส่โดยวิธีหว่าน ให้ใช้วิธีฝังกลบเป็นจุด ๆ กระจายทั่วแปลง
7. แปลงยางที่เปิดกรีดแล้ว หากมีโรคราแป้งระบาดจนใบหลุดร่วง ห้ามเปิดกรีดยางพาราตามฤดูกาล จะต้องรอการเปิดกรีดยางได้ต่อเมื่อยางมีการแตกใบชุดใหม่จนมีสีเขียวเข้มหมดทั้งแปลง และต้องเปิดกรีดตามระบบอย่างเคร่งครัดคือ ระบบกรีดครั้งต้นวันเว้นวัน การใส่ปุ๋ยต้องใส่ปุ๋ยมากขึ้นจากปกติคือ ครั้งแรกใส่ช่วงฤดูฝนที่ยางกำลังผลิใบใหม่ ครั้งที่ 2 ใส่กลางฤดูฝน ครั้งที่ 3 ใส่ช่วงฤดูฝน หากไม่ถือปฏิบัติจะทำให้ต้นยางอ่อนแอต่อการระบาดของโรคได้ ถ้าเป็นยางที่เปิดกรีดอาจจะทำให้เกิดโรคราน้ำแห้งตามมาอีกด้วย
8. ห้ามกรีดยางต้นเล็กที่ยังไม่ได้ขนาด เพราะจะทำให้ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย